

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLAS

Abonnement Annuel

C.C.P. : MONTPELLIER 5.238-57

Nº 104 - MAI 1969/18

3^o supplément

GARD (I7 - I8 - I9 - 20)

LA MOUCHE DE LA CERISE

—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:

Tirage du 14 Mai 1969

Imprimerie de la Station du Languedoc- Directeur-gérant : L. Bouyx.

P 366

Février 1969

DELAIS D'EMPLOI DES PESTICIDES POUR LE TRAITEMENT SUR PIED
DES VEGETAUX DONT LA RECOLTE EST CONSOMMABLE

-/-/-/-/-/-/-/-

Nom commun du produit	Délais en jours	Observations
A - <u>Insecticides d'origine minérale</u>	:	Autorisés sur les cultures suivantes :
- arséniate de plomb	:	- <u>Vignes</u> : de la fin des vendanges jusqu'au début de la véraison
- arséniate de chaux (doryphore seulement)	:	- <u>Pommiers, poiriers, cognassiers</u> : de l'époque qui suit la récolte totale des fruits jusqu'à deux mois au moins avant la récolte.
	:	- <u>Pruniers, pêchers, amandiers</u> : de l'époque qui suit la récolte totale des fruits jusqu'à cinq semaines après la floraison.
	:	- <u>Cerisiers, abricotiers</u> : de l'époque qui suit la récolte totale des fruits jusqu'à la fin de la floraison.
	:	- <u>Noyers, châtaigniers</u> : de l'époque qui suit la récolte et l'enlèvement total des fruits jusqu'à un mois au moins avant la récolte.
	:	- <u>Arbres et arbustes de pépinières</u> : à toutes époques, mais à la condition qu'ils ne portent aucun fruit destiné à être consommé.
	:	- <u>Pommes de terre</u> : jusqu'à une semaine avant l'arrachage.
B - <u>Insecticides d'origine végétale</u>	:	
- Nicotine	10	
- Pyrêthrines synergisées	:	Non dangereux pour les abeilles.
- Roténone	:	Non dangereux pour les abeilles.

P. 367

à suivre

DELAIS D'EMPLOI DES PESTICIDES POUR LE TRAITEMENT SUR PIED
DES VEGETAUX DONT LA RECOLTE EST CONSOMMABLE

-:-:-:-:-

Nom commun du produit	: Délais :	
	: en jours :	Observations
	:	
C - <u>Hydrocarbures chlorés</u> :	:	:
- aldrine	: 30	: Interdit sur toute culture légumière (1) : et toute culture fruitière. En traitement : du sol sur fraisiers, elle est autorisée : seulement avant le départ de la végétation.
- chlordane	: 15	:
- D D D	: 7	:
- D D T	: 15	:
- dieldrine	: 30	: Interdit sur toute culture légumière et : toute culture fruitière.
- endosulfan	: 15	: Non dangereux pour les abeilles
- endrine	: 45	: Autorisé uniquement sur canne à sucre.
- éthylphényldichlo- réthane	: 7	:
- H C H	: 15	: Restriction pour traitement des sols. Pour : le traitement des végétaux sur pied se : reporter aux recommandations techniques : particulières en vue d'éviter une trans- : mission de goût aux récoltes.
- heptachlore	: 21	:
- lindane	: 15	:
- méthoxychlore	: 7	:
- toxaphène et poly- chlorocamphane	: 21	: Non dangereux pour les abeilles.

(1) Les cultures légumières comprennent toutes les cultures de légumes (culture légumière de plein champ, culture maraîchère, culture légumière sous serre et abri, etc), y compris le fraisier. La pomme de terre est considérée comme une plante de grande culture.

.../...

à suivre